

## □ 二重埋没法に関する説明書・同意書 □

### 術式：二重埋没法

二重埋没法は、医療用の糸を使用してまぶたを固定し、二重のラインを形成する施術です。  
皮膚を大きく切開せずに行うため、比較的腫れやダウンタイムが少ない施術です。

### 施術の流れ

#### ①デザイン

ご希望の二重ラインを確認し、まぶたにデザインを行います。

#### ②局所麻酔


上まぶたの適切な位置に、局所麻酔を行います。

#### ③3点固定

医療用の糸を通し、3点を固定した後、糸をまぶたに埋め込みます。

#### ④完成

デザインに沿って自然な二重ラインが完成します。



※ 手術の内容や経過には個人差があります

### 必要性

- ・ 二重ラインの形成
- ・ 目元の印象改善
- ・ 左右差の改善

### 起こりうる副作用・合併症

- |       |               |
|-------|---------------|
| ① 腫れ  | ⑥ 二重幅の変化      |
| ② 内出血 | ⑦ 異物感・ゴロつき    |
| ③ 痛み  | ⑧ 糸の露出        |
| ④ 感染  | ⑨ ラインの消失（後戻り） |
| ⑤ 左右差 | ⑩ 希望ラインからのずれ  |

### 術後注意点

- ・ 当日は首から下のシャワーのみ、洗顔及び入浴は翌日から可能です
- ・ 飲酒・激しい運動・サウナ・長時間の入浴・コンタクトレンズは1週間程度お控えください
- ・ 目元を強く触ると、糸が緩んだり、外れやすくなるのでご注意下さい
- ・ 腫れや内出血には個人差がありますが、1～2週間程度続くことがあります
- ・ 強い痛みや著しい腫れ、異常を感じた場合は当院へご連絡ください

上記に含まれない事項や予期せぬ異常経過があれば、その都度ご説明をさせていただきます。その他ご不明な点があれば、遠慮なくご質問下さい。

### 患者同意欄

私は上記説明を受け、内容について理解した上で、施術を受けることに 同意します

同意日：                      年                      月                      日

患者氏名： \_\_\_\_\_



療法人社団 輔正会  
岡村記念クリニック  
直通：042-985-1001